



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	
کد: NH-In-IPC-05-09	کد سنجه: ب-۵-۶-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۹	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان بخشنامه	شماره صفحه
۱	دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	2-5

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه یزدانی (کارشناس کنترل عفونت)	خانم دکتر میرزایی و کازرانی (متخصص زنان)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	
کد: NH-In-IPC-05-09	کد سنجه: ب-۵-۶-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۹	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

نوع عمل	آنتی بیوتیک مصرفی	دوز مصرفی	آنتی بیوتیک پروفیلاکسی جانشین
هیسترکتومی (ابدومینال-واژینال) <u>کلپورافی</u>	سفازولین	وزن زیر ۱۲۰ کیلوگرم: ۲ گرم وریدی وزن مساوی و بیشتر از ۱۲۰ کیلوگرم: ۳ گرم وریدی	آمپول کلیندامایسین ۹۰۰ میلی گرم وریدی + آمپول جنتامایسین ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی یا آمپول مترونیدازول ۵۰۰ میلی گرم وریدی + آمپول جنتامایسین ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی
سزارین	سفازولین	وزن زیر ۱۲۰ کیلوگرم: ۲ گرم وریدی	آمپول کلیندامایسین ۹۰۰ میلی گرم وریدی + آمپول جنتامایسین ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه یزدانی (کارشناس کنترل عفونت)	خانم دکتر میرزایی و کازرانی (متخصص زنان)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	
کد: NH-In-IPC-05-09	کد سنجه: ب-۵-۶-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۹	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

	وزن مساوی و بیشتر از ۱۲۰ کیلوگرم: ۳ گرم وریدی		
کورتاژ سقط ساکشن کورتاژ D&E	۵۰۰ میلی گرم آزیترومايسين خوراکی بعد از عمل	داکسی سیکلین	
کیست تخمدان EP لاپاراتومی	وزن زیر ۱۲۰ کیلوگرم: ۲ گرم وریدی وزن مساوی و بیشتر از ۱۲۰ کیلوگرم: ۳ گرم وریدی	سفازولین	

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه یزدانی (کارشناس کنترل عفونت)	خانم دکتر میرزایی و کازرانی (متخصص زنان)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	
کد: NH-In-IPC-05-09	کد سنج: ب-۵-۶-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۹	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

سزارین و پارگی طولانی مدت کیسه آب	سفازولین + آزیترومایسین	وزن زیر ۱۲۰ کیلوگرم: ۲ گرم سفازولین وریدی و ۱ گرم آزیترومایسین خوراکی وزن مساوی یابیشتر از ۱۲۰ کیلوگرم: ۳ گرم سفازولین وریدی + ۱ گرم آزیترومایسین خوراکی	آمپول کلیندامایسین ۹۰۰ میلی گرم وریدی + آمپول جنتامایسین ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن وریدی
هیستروسکوپی سیستوسکوپی بیوپسی اندومتر بیوپسی سرویکس کورتاژ اندوسرویکال گذاشتن IUD	آنتی بیوتیک پروفیلاکسی توصیه نشده		

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه یزدانی (کارشناس کنترل عفونت)	خانم دکتر میرزایی و کازرانی (متخصص زنان)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری پور (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی	
کد: NH-In-IPC-05-09	کد سنجه: ب-۵-۶-۱
تاریخ تدوین: بهمن ۱۳۹۹	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ۱۴۰۵

D&C	
توضیحات	با توجه به آموزشی بودن مرکز و حضور دانشجویان ، یک دوز آنتی بیوتیک اضافه پس از عمل داده می شود.

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
فاطمه یزدانی(کارشناس کنترل عفونت)	خانم دکتر میرزایی و کازرانی(متخصص زنان)	خانم دکتر حیدری پور(رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری پور(رئیس مرکز)